

お薬の飲み方



飲み方

必ず指示されたとおりの量と回数に従ってください。飲む時は、薬をシートから取り出し、**コップ1杯程度の水またはぬるま湯**といっしょに飲んでください。食道につかえると粘膜を傷つけることがあるので、とくに就寝前に飲む場合は気をつけてください。

飲み忘れた場合

指示された時間に飲むのを忘れていたら、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は飲まないで、次から時間どおりに飲んでください。絶対に2回分を1度に飲んではいけません。

あやまって多く飲んだ場合

すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

高齢者の場合

特に主治医の指示を守って使用してください。

その他

主治医の指示なしに自分の判断で薬を飲むのをやめないでください。

「ペングッド」

ペニシリン系の**抗生物質**で細菌を殺す作用があるので、細菌による感染の治療に使われます。

朝・昼・晩 **1錠ずつ** お飲みください。



次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。

胸が苦しくなる、急な呼吸困難、冷や汗がでる、目の充血、口内粘膜のただれ、びらん、血尿が出る、おしっこの量が減る、体や足がむくむ、目がはれぼったい、体がだるい、発熱、関節が痛い、激しい下痢（水のような下痢、血便）、腹痛、など。

次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。

発しん、かゆみ、じんましん、貧血、出血が止まりにくくなった、はきけ、胃部不快感、食欲がない、便秘、胸やけ、お腹がはる、口内炎、舌のあれ、など。

他にも何か変だなと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

